ايض الحوامض النووية الغذائية:-

القواعد البيورينية والبرمدينية الغذائية تعد مكونات غذائية غير ضرورية حيث ان النكليوتيدات والحوامض النووية الغذائية (المتناولة في الغذاء) لا تجهز بمكونات ضرورية للتخليق الحيوي للحوامض النووية الداخلية (داخل الجسم) (اي الحوامض داخلية المنشأ) فالإنسان يستطيع تخليق النكليوتيدات البيورينية والبرمدينية من مركبات وسطية اخرى.

هضم الحوامض النووية الغذائية:- Digestion of dietary nucleic acids

- تتحطم الحوامض النووية الموجودة في الغذاء في الامعاء الدقيقة الى نيكليوتيدات احادية Mono nucleotides بواسطة انزيمات الرايبونوكليز Ribonucleases والديوكسي رايبونوكليز deoxyribonucleases و poly nucleotidases
- بعدها تتحطم النكليوتيدات الاحادية الى نكليوسيدات nucleosides بواسطة انزيمات nucleotidases و phosphatases والتي يتضمن قسم منها (اما تمتص) او تتحطم اكثر الى قواعد نتروجينية بيورينية او برمدينية بواسطة انزيم الفوسفوريليز المعوي intestinal peshphorylase
- القواعد البيورينية تتأكسد الى حامض اليوريك بينما تتأكسد القواعد البرميدينية الى CO₂ وامونيا والتي تطرح لاحقا في الادرار
- النكليوسيدات في الكبد والكلية (بعد ان ترحل اليه بواسطة مجرى الدم عند امتصاصها في الامعاء) او الكلية الى قواعد نتروجينية حرة والبننتوز-1-فوسفات Free basses .and pentos-1-phosphate

* الحوامض النووية الغذائية تحطم في الامعاء الدقيقة بواسطة الانزيمات البنكرياسية ان توجد فعالية انزيمات endonucleases و phosphodiesterases و nucleoside phosphorylases يحلل بشكل فعال الحوامض النووية الموجودة في الغذاء.

يحطم انزيم endonucleases الـ DNA و RNA في المواقع الداخلية ويقود الى انتاج محدود النكليوتيدات Oligonucleotides والتي تحطم بعدها بواسطة انزيم phosphodiesterase والذي يعمل من مكونات النكليوسيدات Nucleosides وبعدها تزال القواعد النتروجينية من النكليوسيدات بواسطة فعالية انزيم phosphorylase والذي ينتج Ribose-1-p وقواعد حرة كميات قليلة من البيورينات الغذائية تمتصها وان اكثرها تحطم Catabolised لتكون حامض اليوريك والذي يمكن ان يخدم كمنظف اوفريل للجذور الحرة Free radical scavenger او البرميدينات وتنظم وتنتج β -aminoisbylrate, NH_3 , CO_2

ايض بناء (تخليق) النكليوتيدات البيورينية: - Biosynthesis of Purine

Nucleotides

لتذكير بان النكليوسيدات تتكون من تارتباط البيورينات او البرميدينات (قاعدة بيورينية او برميدينية) مع سكر خماسي pentose وهو سكر الرايبوز وان النكليوتيدات هي استر الفوسفات للنكليوسيدات.

جميع الكائنات الحية تقريبا (ماعدا بعض انواع البكتريا) قادرة على تخليق النكليوتيدات البيورينية والبرميدينية.

هناك نوعان من النكليوتيدات البيورينية في الحوامض النووية وهي:

١- ادينوسين احادي الفوسفات (AMP) Adenosin mono phosphate والتي تحتوي

الادنين كقاعدة بيورينية

٢- كوانوسين احادي الفوسفات (GMP) Guanosine mono phosphate والتي تحتوي

القاعدة البيورينية الكوانين Guanine

النكليوتيدات البيورينية يمكن ان تخلق بمسلكين:-

1- De novo pathway (New synthesis from amphibolic intermediates)

2- Salvage pathway

- By phosphoribosylation of free purine bases.
- By phosphorylation of purine nucleosides.

١- طريقة de novo لتخليق النكليوتيدات البيورينية:-

تبدأ عملية التخليق الحيوي للنكليوتيدات البيورينية من مركب Ribose-5-phosphate والذي يتكون بمسلك الفوسفات الخماسي pentose phosphate pathway والذي يتحول الى فوسفورايبوزيل بايرو فوسفيت PRPP phosphoribosylpyrophosphate بواسطة نقل مجموعة بايرو فوسفيت Grop pyro phosphat من جزيئة ATP الى ذرة الكاربون الاولى سكر الرايبوز وهذا التفاعل يجري بتحفيز انزيم PRPP synthase

- * ان ال PRPP يمكن ان يستخدم في تخليق النكليوتيدات البيورينية و البرمدينية بطريقة de nove. تخليق
- * ان ال PRPP هو المركب الوسطي لتخليق النكليوتيدات البيورينية بمسار salvage pathway ايضا
- * كما تدخل ال PRPP في التخليق الحياتي لـ NAD^+ and $NADP^+$ والمخطط التالي يوضح ذلك

مخطط

بعد تكوين النكليوسيدات احادية الفوسفات تتحول الى نكليوسيدات ثنائية الفوسفات وكما يلي:-

تتحول النكليوتيدات AMP و GMP وهي الاديونسين احادي الفوسفات والكوانوسين (احادي الفوسفات) الى نكليوسيدات ثنائية الفوسفات ADP و GDP وذلك بفسفرة النكليوسيدات احادية الفوسفات بواسطة جزيئة ATP بتحفيز انزيم Nucleoside mono phosphatkinase بعدها ال ATP المتكون من يتفسر مرة اخى الى جزيئة ATP بواسطة تفاعلات مسار انحلال السكر Glycolysis او دورة كريبس Citric acid cycle او بواسطة الفسفرة التأكسدية oxidative phosphorylation وبواسطة السلسلة التنفسية (respiratory chain)

اما جزيئة الGDP فتتحول الى GTP بواسطة الانزيم Nucleoside diphosphate kinase بصرف جزيئة اخرى من ال ATP

مخطط

مسار تخليق De novo للنكليوتيدات البيورينية

Regulation of de novo synthesis of purine nucleotide

النكليوتيدات البيورينية تنظم بواسطة:

The synthesis of purine nucleotides is controlled by:-

١- بواسطة تركيز PRPP، PRPP Cncentration of

٢- تنظيم التغذية المرتدة على عدة مواقع Feedback regulation at several sites

ان زيادة تركيز الـ PRPP يحفز تخليق النكليوتيدات البيورينية وان معدل تخليق الـ PRPP يعتمد على:-

أ- توفر Ribose-5-phosphate

ب-فعالية انزيم PRPP Synthase

اما التنظيم بالتغذية المرتدة Feedback Regulation

فهي تتم بتعاقد ثلاث ميكانيكيات رئيسية لتنظيم المعدل الكلي لتخليق النكليوتيدات البيورينية بطريقة de novo.

١- الخطوة الاولى من ميكانيكيات التنظيم لهذه الظاهرة على الخطوة للتفاعل والتي تقود الى تكوين الـ PRPP حيث ان هذا التفاعل يحفز بواسطة الانزيم المنظم الالوستيري PRPP Synthase (Allosteric enzyme) والذي يثبط رجوعا بالتغذية المرتدة بواسطة النكليوتيدات البيورينية AMP, GMP and IMP عند ما يزداد تركيزها وحتى , ADP GDP

٢- الخطوة الثانية في تفاعل تخليق النكليوتيدات البيورينية هو تحول الـ PRPP الى phosphoribosylamine ويثبط هذا التفاعل رجوعا بواسطة النكليوتيدات البيورينية وخصوصا AMP, GMP

٣- ان الـ AMP, GMP تنظم بالتغذية المرتدة تكوين IMP

مخطط

تخليق النكليوتيدات البيورينية بمسار Salvage:

Synthesis of purine Nucleotides by salvage pathway

مسلك salvage مجهز بنكليوتيدات بيورينية للانسجة غير القادرة على تخليقها بواسطة مسلك de novo (من جزيئات جديدة)

مثلا دماغ الانسان يمتلك تركيز واطي من الانزيم PRPP Glutaryl aminotransferase لذلك يعتمد جزئيا على البيورينات الخارجية exogenous purines كريات الدم الحمراء والبيضاء لا يمكنها تخليق 5-phosphoribosylamine لذلك تعتمد على البيورينات الخارجية في تخليق النكليوتيدات.

يعتبر مسار salvage هو المصدر الرئيسي للنكليوتيدات المستخدمة في تخليق الحوامض النووية والمرافقات الانزيمية.

* تعريف:- المسار المتضمن تحويل البيورينات purine و purine ribonucleoside الى deoxyribonucleosides الى النكليوتيدات احادي Mononucleotides يدعى salvage pathway و salvage تعني خصوصية محفوظة من الفقد او الخطر salvage means property saved from loss or danger

The ability to salvage nucleotides released during nucleic acid turnover and degradation spares any nutritional requirement for nucleotides. There for purins and pyrimidine bases are not essentially required in the diet

ان القواعد البيورينية والبرمدينية الحرة التي تتكون في الخلايا خلال الايض الهدمي Metabolic degradation للحوامض النووية والنكليوتيدات جزء كبير من القواعد البيورينية الحرة salvaged وتستخدم مرة ثانية لتكوين نكليوتيدات اخرى. ان هذه الخطوة تختلف عن مسار تخليق de novo للبيورينات والذي يخلق ابتداء من Ribose-5-phosphate بسلسلة طويله من التفاعلات مع استخدام جزيئات صغيرة كثيرة ان مسلك salvage ابسط كثيرا وبطاقة اقل بكثير من مسار de novo وهو يتكون من تفاعل منفرد حيث ان هناك ميكانيكيتان two mechanisms لتفاعلات مسار salvage

١- تفاعل salvage بواسطة الفسفرة الرايبوزية pphosphoribosylation للقواعد البيورينية (اضافة جزيئة رايبوز مفسفرة الى القواعد البيورينية)

٢- تفاعل salvage بواسطة الفسفرة phosphorylation للنكليوسيدات البيورينية

مخطط

مسار De novo لتخليق النكليوتيدات البيرميدينية: - CMP, TMP, UMP

ويبدأ المسار بتكوين Carbamoyl phosphate من الكلوتامين و ATP و Co_2 بتحفيز الانزيم Carbamoyl phosphate synthase-II الساييتوبلازمي والذي يختلف عن انزيم (cps-I) carbamoyl phosphate synthase-I الموجود في الماييتوكوندريا والذي يدخل في تخليق اليوريا.

ويشكل مخالف لتخليق النكليوتيدات البيورينية فأن الحلقة السادسة للبرميدينات تتكون اولاً ثم تصنيفه Ribose-p والتي تمنح لها بواسطة PRPP.

مخطط

تفاعلات مسار Salvage تتحول فيه اثنان من النكليوسيدات البيرميدينية (uridine and cytidine) واثنان من النكليوسيدات منقوصة الاوكسجين

deoxyribonucleosides (deoxythymidine and deoxycytidine) الى النكليوتيدات المقابلة

تخليق النكليوتيدات ذات سكر الرايبوز منقوص الاوكسجين :- Synthesis of

deoxyribonucleotides

وتخلق الـ deoxyribonucleotides بواسطة اختزال الـ Ribonucleoside diphosphate والذي فيه مجموعة هيدروكسيل الموقع -2- على الرايبوز تستبدل بذرة هيدروجين وعملية الاختزال على ذرة كاربون رقم -2- في النكليوتيدات البيورينية والبرميدينية تحفز بواسطة الانزيم (معقد الانزيم) Ribonucleotide reductase complex.

ان معقد الانزيم هذا يكون فعال فقط (ينشط فقط) عندما تكون الخلية في حالة تخليق نشط للـ DNA استعدادا لانقسام الخلية Cell division

مخطط

ايض هدم النكليوتيدات البيورينية: Catabolism of purine nucleotides

ان الناتج النهائي لهدم البيورينات (الادينين والكوانين) هو حامض البوريك القليل الذوبان في بعض الثدييات (ماعدا الانسان القرود) يتأكسد حامض البوريك الى مركب allantoin (والذي في حيوانات اخرى غير الثدييات يمكن ان يتحطم اكثر الى اليوريا وربما حتى الامونيا).

خطوات هدم النكليوتيدات البيورينية:-

١- تحطم النكليوتيدات البيورينة اولا بإزالة مجموعة الفوسفات بواسطة فعالية الانزيم nucleotidase لتكون نكليوتيدات الادينوسين او الكوانوسين (Adenosine or Guanosine)

٢- تزال مجموعة الامين من الادينوسين لتكوين الاينوسين inosine بواسطة فعالية الانزيم adenosine deaminase

٣- الاينوسين المتكون من الادينوسين يتأكسد الى القاعدة النايتروجينية hepoxanthine والرايبوز-1-فوسفات Ribose-1-phosphate وذلك بفعل الانزيم purinenucleoside phosphorylase.

٤- ثم يتأكسد الهايبوزانثين hypoxanthine الى زانثين xanthine بفعل الانزيم xanthine oxidase ويستمر هذا الانزيم بأكسدة الزانثين الى حامض البوريك uric acid وفي هذا التفاعل تختزل جزيئة ال O₂ الى H₂O₂ والذي يتفكك لاحقا بواسطة انزيم Catalyase.

٥- الكوانوسين المتكون في الخطوة الاولى تنتشر الى الكوانين guanine و Ribose-1-phosphate بواسطة فعالية انزيم الفوسفوريلز phosphorylase

٦- تعاني جزيئة الكوانين ازالة بالانحلال hydrolytic removal لمجموعة امينها بواسطة انزيم الكوانيز guanase لتكوين الزانثين والذي يتحول الى حامض البوريك بواسطة فعالية الانزيم xanthine oxidase.

هدم نكليوتيدات البرميدين:- Catabolism pyrimidine nucleotides

النواتج النهائية لهدم النكليوتيدات البرميدية هي

Co₂, NH₃, β-Alanine, and β-Aminoisobutyrate

مخطط

- في الانسان تزال مجموعة الامين من β -Aminoisobutyrate ويتحول الى مالونات المثيل Methylmalonate semialdeh والذي يتحول لاحقا الى succinyl-CoA مرورا (خلال) Mathyl Malonate-CoA
- β -Alanine يمكن ان يستخدم كمولد Acetyl-CoA
- وبما ان لا يوجد انزيم في جسم الانسان قادر على تحفيز تحلل Hydrolysis او تحليل فسفور phosphorolysis نكليوتيدات البيوريدين Pseudouridine فأنها تطرح بدون تغيير مع الادرار في الاشخاص الاعتيادين normal Subjects (غير المرضى)

Disorders Associated with - النكليوتيدات البيورينية والبريميدينية:-

purine and pyrimidine Nucleotide Metabolism

Disordor of purine catabolism - اعتلالات هدم البيورين:-

ان عملية هدم الادنين والكوانين تنتج حامض اليوريك وفي الPH الفسيولوجي للجسم فأن حامض اليوريك يتأين ويوجد في بلازما الدم بشكل يورات الصوديوم (Sodium urate)

ان ارتفاع تراكيز اليورات في مصل الدم يعرف بhyperuricaemia هايبريوريكيميا. ان حامض اليوريك واليورات جزيئات غير ذائبة نسبيا (قليلة الذوبانية) نسبيا وتترسب بسهولة خارج المحلول المائي للادرار urine او السوائل الزلالية synovial fluid واستمرار عملية الترسيب تؤدي الى تكوين gout داء النقرس.

المعدل الطبيعي لمستويات حامض اليوريك في مصل الدم 4-7mg/100ML الحد الاعلى لمستويات urate في الدم 6.4mg/100ML وهي اعلى ذوبانية لليورات بشكل ملح الصوديوم.

العوامل التي تؤثر على تكوين حامض اليوريك:-

تكوين حامض اليوريك يعتمد على معدل:-

1- تخليق البيورينات بطريقة De novo synthesis of purines

٢- معدل ايض الـ DNA والـ RNA الداخلية وبقية الجزيئات الحاوية على البيورينات مثل

ATP

٣- معدل تحطم Break down للحوامض النووية الغذائية

طرح حامض اليوريك:- Excretion of uric acid

- ان معظم حامض اليوريك يطرح بواسطة الكلية خلال الادرار
- وان قسم صغير من اليورات تطرح الى قناة الهضمية حيث تحطم بواسطة البكتريا هناك وتعرف العملية urico lysis وتحليل حامض اليوريك.

اعتلالات هدم البرميدين:- Disorders of pyrimidine catabolism

بما ان النواتج النهائية لهدم البرميدينات هي مركبات عالية الذوبان في الماء فإن الايض العالي او الانتاج العالي لهدم البرميدينات نادرا ما يرتبط مع حالات غير اعتيادية مهمة سريريا

Since the end products of pyrimidine catabolism are highly water soluble over production of pyrimidine catabolites is rarely associated with clinically significant abnormalities.

ارتفاع حامض يوريك الدم:- Hyperuricaemia

ارتفاع يورات الدم يأتي من :

- ١- زيادة تكوين حامض اليوريك والذي يعزى الى اسباب رئيسية primary وهي اسباب جينية genetic او اسباب ثانوية secondary cause
- ٢- قلة نقص طرح حامض اليوريك المتكون بواسطة الكلية.